kontaktu. Przy alergiach dających dolegliwości tylko okresowo, można stosować w tym czasie środki farmakologiczne. Przy całorocznych objawach działania uboczne wynikające z długotrwałego stosowania terapii farmakologicznej mogłyby niekorzystnie odbić się na zdrowiu psa. Dlatego w takich przypadkach należałoby rozważyć zastosowanie immunoterapii (desensybilizacji).

W immunoterapii wyciągi alergenów dobierane są indywidualnie dla psa na podstawie wyników testów alergicznych. Zawierają one minimalne ilości substancji, na które uczulony jest pies. Substancje te tygodniami wstrzykiwane są zwierzęciu w coraz większych ilościach i rosnących odstępach czasu. U większości psów dzięki tej terapii zwiększa się tolerancja na alergeny. W efekcie pies znów może poczuć się dobrze w swoim otoczeniu. Poprawę można zaobserwować w wielu przypadkach już po kilku tygodniach, w niektórych jednak na efekty trzeba poczekać kilka miesięcy. U ponad 70% psów terapia ta daje odczuwalną poprawę lub czasem całkowite ustąpienie objawów.
Ponieważ alergia jest nieuleczalnym schorzeniem, immunoterapię, o ile jest skuteczna, należy stosować latami, a w pewnych przypadkach nawet przez całe życie. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się działania uboczne, dające przemijające lekkie nasilenie objawów alergicznych. Dopasowując odpowiednio dawkę wyciągu alergenów lekarz może szybko złagodzić niepożądane objawy.

Należy jednak pamiętać, że alergia jest chorobą na całe życie, jest nieuleczalna i może być dziedziczona!

Wspólnie z Waszym lekarzem będziecie Państwo w stanie postawić właściwą diagnozę, a stosując odpowiednią terapię, zapewnić zwierzęciu optymalną jakość życia.

Objawy

Pierwszym zauważalnym objawem alergii jest silny świąd. Później pojawiają się zmiany skórne, takie jak zaczerwienienia, strupy, wyłysienia. Powstają one przez drapanie i często są zainfekowane bakteriami.

Najczęściej pierwsze objawy alergii u psów pojawiają się w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wyjątek stanowi alergia pokarmowa, która może wystąpić niezależnie od wieku i rasy, jednak bardziej narażone są rasy: bokser, retriever oraz owczarek niemiecki.

Zmiany można zaobserwować zwłaszcza w obrębie kufy (okolice pyska) i łap oraz przestrzeni pomiędzy palcami). Może dochodzić również do chronicznych stanów zapalnych uszu.
W przypadku alergii na pchły choroba ogranicza się najczęściej do okolic nasady ogona. U psa z alergią pokarmową mogą się dołączyć objawy w postaci biegunki czy wymiotów

LABOKLIN
Polska Sp. z o.o.

www.LABOKLIN.com

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO.KG

PL Warszawa • 01-495 • Powstańców Śląskich 101
tel. 022/691 93 10..11..12 • tel/fax. 022/691 92 92
e-mail: lab.warszawa@laboklin.pl • www.laboklin.pl

PL Opole • 45-517 • Obrońców Stalingradu 66 pok. 200A
VETEXPRESS
tel. 077/423 04 72 • fax 077/423 04 73
e-mail: lab.opole@laboklin.pl • www.laboklin.pl

D Bad Kissingen • D-97688 • Steubenstraße 4
tel. +49-971/72020 • fax +49-971/68546
e-mail: info@laboklin.de • www.laboklin.de

LABOKLIN
Polska Sp. z o.o.

Co powinniście wiedzieć o alergiach u psów?

Co powinniście wiedzieć o alergiach u psa?

Alergia (nadwrażliwość) jest chorobą, która może dawać bardzo różne objawy u psa. Zasadniczo chodzi tutaj o przesadną reakcję systemu immunologicznego, która może objawiać się w wieloraki sposób.

Najważniejszym objawem u psa jest świąd, a w następstwie pojawienie się różnych zmian skórnych. Nasilenie objawów może być różne u poszczególnych psów: u jednych może przybierać bardzo łagodne formy, u innych natomiast objawy mogą być bardzo uciążliwe, co istotnie przyczynia się do pogorszenia jakości życia psa.
Istnieje wiele rodzajów alergii w zależności od czynnika alergennego, a w związku z tym wiele terapii leczniczych. Dlatego koniecznym jest postawienie właściwej diagnozy przy zastosowaniu odpowiednich badań. Najczęstszymi przyczynami alergii u psów są pchły, roztocza, pyłki oraz alergeny pokarmowe.

Co może wskazywać na alergię?

1.) Czas i miejsce wystąpienia reakcji uczuleniowej są pierwszymi ważnymi wskazówkami. Jeśli objawy nasilają się wiosną i latem, przyczyną mogą być pyłki. Występowanie objawów aż do późnej jesieni może świadczyć o alergii na pchły.
2.) Alergia na roztocza lub kurz może występować przez cały rok - objawy mogą się zaostrzać, kiedy pies śpi w sypialni.
3.) W przypadku alergii pokarmowej można czasem zaobserwować związek z podawanym pokarmem, jednak objawy mogą się

pojawić z opóźnieniem, nawet kilkanaście dni po zjedzeniu, co często znacznie utrudnia znalezienie związku pomiędzy karma a alergią. Zmiana marki lub smaku karmy na inny zazwyczaj nie przynosi poprawy.

Wstępną czynnością diagnostyczną jest gruntowna analiza warunków życia psa. Lekarz weterynarii stosując odpowiednie badania, musi wykluczyć inne schorzenia, którym towarzyszą podobne objawy.

O tym, jakie badania będą najwłaściwsze, zadecyduje lekarz na podstawie rodzaju zmian na skórze. Może pobrać, a następnie wysłać próbki do badania pod kątem występowania bakterii, grzybów czy też pasożytów.
Niektóre choroby można zdiagnozować na podstawie badań krwi. Kiedy już wykluczone zostaną inne przyczyny, lekarz podejmie kolejne czynności służące zdiagnozowaniu alergii.

Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje badań:

Test skórny

Psu wstrzykiwane są podskórnie różne ekstrakty alergenów (pyłki, roztocza, etc.). Na podstawie reakcji w miejscu iniekcji lekarz stwierdza czy wystąpiła reakcja alergiczna na daną substancję.

Badanie krwi

W niektórych alergiach organizm produkuje przeciwciała przeciw alergizującym substancjom. Obecność przeciwciał można oznaczyć badając krew.

Żaden z powyższych testów nie ma uniwersalnego zastosowania. To lekarz decyduje o najodpowiedniejszym rodzaju badania oraz dokonuje wnikliwej analizy wyników.

Szczególny przypadek - alergia pokarmowa

Szczególny przypadek przedstawia alergia pokarmowa. To trudna do zdiagnozowania choroba ze względu na to, że system immunologiczny przewodu pokarmowego może reagować w przeróżny sposób.
Właściwą diagnozę pozwala postawić tzw. dieta eliminacyjna. Wymaga ona jednak 100% -owej konsekwencji właściciela i w rodzinach z małymi dziećmi, osobami starszymi lub kilkoma pupilami jest bardzo trudna do przeprowadzenia.
Dla prawidłowej diagnozy i późniejszego leczenia konieczne jest stosowanie tylko i wyłącznie karmy zaleconej przez lekarza. Wszelkie inne pokarmy, mając na celu zdrowie psa, są surowo wzbronione. W tej diecie stosuje się przez okres do dwóch miesięcy albo karmę weterynaryjną, wybraną przez lekarza, albo zalecone jedzenie domowe.
Jeśli objawy alergii znikną podczas stosowania diety, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że przyczyną był jeden ze składników pokarmowych poprzedniej karmy. Później można na próbę powrócić do starej karmy - pojawienie się objawów da nam pewność, że mamy do czynienia z alergią pokarmową.
Badania krwi pozwalają dodatkowo stwierdzić obecność przeciwciał przeciw różnym składnikom pokarmowym. Badanie to pomoże Wam i Waszemu lekarzowi dobrać odpowiednie składniki diety pupila.
Istnieją jednak formy nietolerancji pokarmowej, które nie są uwarunkowane alergią, tzn. organizm nie wytwarza przeciwciał. W takich przypadkach tylko dieta eliminacyjna może doprowadzić do postawienia właściwej diagnozy.

Znamy już alergeny - i co dalej?

Najlepszą terapią jest unikanie alergizujących czynników. W przypadku alergii na pchły czy pokarm jest to dość łatwe. W przypadku alergii na pyłki czy roztocza raczej trudno jest uniknąć wzajemnego